



Monotypisch

Niet uit Nederland of Vlaanderen bekend

- 1 Vruchtlichaam bestaat uit gelatineuze druppels; sporen repetend en paarsgewijs (bron: Mycokey). Aan de binnenzijde van graafgangen van schorskevers: *Crypturgus pusillus* (Kleine sparschorskever), *Dryocoetes autographus* (Ruige dennenschorskever), *Hylurgops palliatus* (Geelbruine sparsenbastkever), *Ips typographus* (Letterzetter), *Orthotomicus laricis* (Lariksschorskever), *Pityogenes chalcographus* (Koperetser). In naaldbomen waaronder *Picea abies* en *Pinus sylvestris*. Bekend uit Duitsland (Bremerhaven en Beieren) en Zwitserland (Kirschner *et al.* 1999)

..... *A. pulvinatus* R. Kirschner, R. Bauer & Oberw.
Kirschner *et al.* 1999, Mycologia 91(3): 538-543



fig 1 Graafgangen van de Letterzetter (*Ips typographus*)
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bk1.jpg#/media/Bestand:Bk1.jpg>

OPMERKINGEN

Het is niet duidelijk of de vruchtlichamen ook in het veld zijn aangetroffen of alleen bekend zijn van kweek.

LITERATUUR

Kirschner, R., Bauer, R. & Oberwinkler, F. 1999. *Atractocolax*, a new heterobasidiomycetous genus based on a species vectored by conifericolous bark beetles. Mycologia 91(3): 538–543

WWW

<http://www.mycokey.com/MycoKeySolidState/genera/Atractocolax.html>