



Gebaseerd op Roberts 1997 en Kirschner *et al.* 2001

Niet uit Nederland en Vlaanderen bekend

- 1 In holtes en gangen in het cambium en secundair phloem van Gewone zilverspar (*Abies alba*), Europese lariks (*Larix decidua*), Fijnspar (*Picea abies*) en Grove den (*Pinus sylvestris*) van naaldboombewonende schorskevers groeiend. Gespen afwezig
. *C. cuniculicola* R. Kirschner, D. Begerow & Oberw.

Kirschner *et al.* 2001, Mycol. Res. 105(11): 1403-1408

Onder andere gevonden in gangen van Ruige dennenschorskever (*Dryocoetus autographus*), Geel bruine sparrenbastkever (*Hylurgops palliatus*), *Ips acuminatus*, Zestand-dennenschorskever (*I. sexdentatus*), Letterzetter (*I. typographus*), Lariksschorskever (*Orthotomicus laricis*), Koperetser (*Pityogenes chalcographus*), *Pityokteines spinidens*, Tweeogige sparrenschorskever (*Polygraphus poligraphus*).

Op korstmossen groeiend. Gespen aanwezig (soms lastig waar te nemen omdat deze kunnen uitgroeien) Zie *Crittendenia*