



Monotypisch

Niet uit Nederland en Vlaanderen bekend.

- 1 Vruchtlichaam korstvormig, taai met een dikke, behaarde rand; basidiën 16-22(-24) x 13-21(-23) µm; sporen 13-17(-20) x 8-10 µm  
..... *Fibulosebacea strigosa* (Bourdot & Galzin) K. Wells & Raitv.  
Wells & Raitviir 1987, Trans. Br. Mycol. Soc. 89(3): 341-346

## OPMERKINGEN

Er is heel weinig literatuur over deze soort. *F. strigosa* staat niet vermeld in een van de standaardwerken (Jülich 1984 en Hansen & Knudsen 1997), maar is o.a. bekend uit Tsjechië, Portugal, Spanje, Frankrijk, Denemarken en Noorwegen (GBIF april 2019, Wells & Raitviir 1987)

In *Fibulosebacea* zijn de tandjes, als ze aanwezig zijn, meestal fertiel, maar soms ook steriel en dan is verwarring mogelijk met *Heterochaete macrochaete*, die altijd steriele tandjes in het hymenium heeft (Wells & Raitviir 1987).

Er is ook verwarring mogelijk met *Eichleriella*, omdat de vruchtlichamen daarvan ook dik en taai zijn en de basale laag uit dikwandige hyfen met gespen bestaat.

## LITERATUUR

Jülich, W. 1984. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora Band IIb/1. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.

Wells, K. & A. Raitviir 1987. New and noteworthy taxa of the Exidiaceae of the U.S.S.R. Trans. Br. Mycol. Soc. 89(3): 341-346

## WWW

GBIF: <https://www.gbif.org/search?q=fibulosebacea%20strigosa> (april 2019)