



Sleutel tot de soorten van Noordwest-Europa. Vertaling van en deels bewerkt naar Spirin *et al.* 2019 (met toestemming auteur).

Trama-cystiden diep wortelend en dikwandig, vaak in bundels en aanwezig bij alle soorten. Hymeniale cystiden bij de meeste soorten aanwezig, maar afwezig in *P. madidus*. Stervormige kristallen vaak, maar niet altijd aanwezig.

Vet - Uit Nederland en/of Vlaanderen bekend

- 1 Op naaldhout. Vruchtlichaam wasachtig tot gelatineus, grijsig tot okerbruin. *P. brachysporus* (Luck-Allen) Spirin & V. Malysheva
Spirin *et al.* 2019, Mycol. Progr. 18: 1079-1099 ●
Jülich: 416 (als *Heterochaetella b.*)
Op loofhout. Vruchtlichaam met harige vlokjes (floccoos) of wasachtig. 2
- 2 Vruchtlichaam vers halfdoorschijnend, droog nauwelijks zichtbaar 3
Vruchtlichaam met harige vlokjes of wasachtig, droog goed zichtbaar 4
- 3 Hymeniale cystiden aanwezig, breed clavaat; sporenlengte 5.24-5.51 μm *P. commotus* Spirin & V. Malysheva
Spirin *et al.* 2019, Mycol. Progr. 18: 1079-1099
Hymeniale cystiden afwezig; sporenlengte 5.32-7.15 μm
. *P. madidus* Spirin & K.H. Larss.
Spirin *et al.* 2019, Mycol. Progr. 18: 1079-1099
- 4 Vruchtlichaam blijvend bleek en met harige vlokjes; sporenbreedte 3.49-3.89 μm *P. pertusus* V. Malysheva & Spirin
Spirin *et al.* 2019, Mycol. Progr. 18: 1079-1099
Vruchtlichaam eerst bleek en met harige vlokjes, later donkerder en gedeeltelijk gelatineerd; sporenbreedte 3.98-4.20 μm . Zie fig 1 . . . (Witte suikertrilzwam) *P. dubius* (Bourdot & Galzin) Spirin & V. Malysheva
syn. *Stypella dubia*, *Heterochaetella d.*
Spirin *et al.* 2019, Mycol. Progr. 18: 1079-1099 ●
Jülich: 416 (als *Heterochaetella d.*) ● H&K: 107 (als *Heterochaetella d.*)



fig 1 *Protomerulius dubius* met harig, vlokkig oppervlak. Foto Ida Bruggeman-Nannenga.

SYNONIEMEN

- *P. caryae* zie bij *Aporpium* Opmerkingen