



Gebaseerd op Roberts 1997 en Kirschner *et al.* 2001

Niet uit Nederland en Vlaanderen bekend

- 1 In holtes van schorskevers groeiend. Gespen ontbreken
... *Chionosphaera cuniculicola* R. Kirschner, D. Begerow & Oberw.
Kirschner *et al.* 2001, Mycol. Res. 105(11): 1403-1408

Op korstmossen groeiend. Gespen aanwezig (soms lastig waar te nemen omdat deze kunnen uitgroeien) 2
- 2 Basidiën 20-45 µm lang
... *Chionosphaera lichenicola* Alstrup, B. Sutton & Tunsberg
Kirschner *et al.* 2001, Mycol. Res. 105(11): 1403-1408

Basidiën 60-70 µm lang *Chionosphaera coppinsii* P. Roberts
Roberts 1997, Mycotaxon 63: 195-216

OPMERKINGEN

C. coppinsii is bekend van *Parmelia glabratula* en *Lecidella elaeochroma* (Groot-Brittannië).

LITERATUUR

- Kirschner, R., Begerow, D. & Oberwinkler, F. 2001. A new *Chionosphaera* species associated with conifer inhabiting bark beetles. Mycol. Res. 105(11): 1403-1408
- Roberts, P. 1997. New heterobasidiomycetes from Great Britain. Mycotaxon 63: 195-216