



syn. *Heterotextus*
Kelkhoortje

Sleutel tot de Europese soorten gebaseerd op Jülich 1984 en Hansen & Knudsen 1997 (H&K)

Er is verwarring mogelijk met *Dacrymyces*. *Guepiniopsis* onderscheidt zich van *Dacrymyces* door het bezit van een gedifferentieerde cortex, maar dat kenmerk is niet altijd even duidelijk te herkennen en dat is mogelijk de oorzaak van het heen-en-weer switchen van enkele soorten tussen beide genera. Bij twijfel dan ook *Dacrymyces* raadplegen. Een deel van de sporen en basidiën hebben caroteen bevattende druppeltjes te herkennen aan de oranje kleur.

Vet - Uit Nederland en/of Vlaanderen bekend

- 1 Hyfen met gespen. 2
Hyfen zonder gespen 3
- 2 Sporen met 1-3 septen *G. alpina* (Tracy & Earle) Brasf.
Jülich: 441 • H&K: 96 (als *Heterotextus a.*) • Læssøe
et al., 2019: 1158
Sporen met 5-7 septen. *G. suecica* (McNabb) Jülich
Jülich: 442 • Dueñas 2005, Nova Hedwigia 81(1-2):
177-198
Basidiën van het W-type.
- 3 Sporen met 5-7 septen; basidiën omgekeerd knotsvormig tot urn-
vormig *G. estonica* (Raitv.) M. Dueñas
Jülich: 437 • H&K: 94 (als *Dacrymyces e.*) • Dueñas
2005, Nova Hedwigia 81(1-2): 177-198 • Læssøe *et al.*, 2019: 1158
Sporen met 1-3 septen; basidiën knotsvormig 4
- 4 Vruchtlichaam oranjegeel tot vaalgeel; buitenzijde vaak geribbeld.
. (Geribbeld kelkhoortje) *G. buccina* (Pers.) L.L. Kenn.
Jülich: 441 • Læssøe *et al.*, 2019: 1158
Vruchtlichaam bruin; buitenzijde glad *G. fulva* P. Delivorias
Delivorias *et al.* 2012
Sporen 13.1–17.0(-17.3) × (5.2-)5.5–7.2(-7.9) µm.
Op ontschorst hout van beuk (*Fagus sylvatica*). Al-
leen bekend uit centraal Griekenland



fig. 1 *Guepiniopsis suecica* op *Pinus unciatus* (Spanje 2022). Foto Roeland Enzlin

SYNONIEMEN

- *G. chrysocoma* zie *Dacrymyces chrysocomus*

OPMERKINGEN

G. ovispora B. Liu & L. Fan is een niet-Europese soort en geen synoniem van *Dacrymyces ovisporus* (Zie Mycobank, Index Fungorum)

Het is niet bekend of het basidiumvorktype (Van de Put 2014) van enige waarde is bij *Guepiniopsis*.