



Gebaseerd op Jülich 1984.

Niet uit Nederland of Vlaanderen bekend

- 1 Vruchtlichaam dun en wit; berijpt, met talrijke fijne, steriele stekeltjes in het hymenium; basidiën 12-18 x 8-11 μm ; sporen 15-18 x 6-7 μm *Heterochaete macrochaete* Bres. & Torrend

Jülich: 416

SYNONIEMEN

- *Heterochaete spinulosa* zie *Heteroradulum spinulosum*
- *Heterochaete spinulosa* ss. auct. brit. (eur.?) zie *Heteroradulum deglubens*

OPMERKINGEN

Er is heel weinig literatuur over deze soort en wordt niet besproken door Malysheva *et al.* 2017.

Volgens GBIF zijn er 3 waarnemingen uit Portugal en 1 uit Italië

Er is verwarring mogelijk met *Fibulosebacea strigosa*, waarvan de tandjes, als ze aanwezig zijn, meestal fertiel zijn, maar soms ook steriel. *H. macrochaete* heeft altijd steriele tandjes in het hymenium (Wells & Raitviir 1987).

LITERATUUR

Jülich, W. 1984. Die Nichtblätterpilze, Gallertpilze und Bauchpilze. Kleine Kryptogamenflora Band IIb/1. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart

Malysheva, V. & Spirin, V. 2017. Taxonomy and phylogeny of the Auriculariales (Agaricomycetes, Basidiomycota) with steroid basidiocarps. Fungal Biol. 121: 689-715

Torrend, C. 1913. Les Basidiomycetes des environs de Lisbonne et de la région de S. Fiel (Beira Baixa) [concl.]. Brot. S. Bot. 11: 54-98

Wells, K. & Raitviir, A. 1987. New and noteworthy taxa of the Exidiaceae of the U.S.S.R. Trans. Br. mycol. Soc. 89(3): 341-346

WWW

GBIF: <https://www.gbif.org/species/3314430> (april 2019)